



SITUATION AU 17/03/2026

La semaine passée fut mitigée avec des averses entrecoupées de journées ensoleillées. Les pluies sont tombées sur l'ensemble de notre zone ce qui va permettre aux fertilisants de fondre et ainsi d'alimenter les cultures.

Les travaux dans les champs et prairies ont été soutenus (apport d'engrais, désherbage, régulateur, épandage d'effluent d'élevage).

La pluviométrie de la semaine écoulée est assez régulière, vous trouverez ci-dessous quelques données issues de stations SENCROP.

Lieux	Cumuls sur 7 jours	Lieux	Cumuls sur 7 jours
Arc les gray	40 mm	Aboncourt-gésincourt	42 mm
Sampans	50 mm	Rioz	44 mm
Petit-Noir	54 mm	Marnay	56 mm
Colonne	59 mm	Arc et senans	49 mm

COLZA

STADES DE LA SEMAINE

D1 à E
(quelques parcelles à F1)



À SUIVRE CETTE SEMAINE

> Gestion méligèthes



- Toute intervention est à éviter à partir de l'apparition des premières fleurs dans la végétation sauf si la pleine floraison ne se produit pas une semaine après l'apparition des premières fleurs.

Seuils d'intervention en fonction de l'état du colza et de son stade

	Colza au stade D1	Colza au stade E
Colza vigoureux	Pas d'intervention	6 à 9 méligèthes par plante*
Colza peu vigoureux	50% de plantes infestées ou 1 méligèthe par plante*	65 à 75% de plantes infestées ou 2 à 3 méligèthes par plante*

*Les comptages en bordure ou sur les plantes les plus hautes ne sont pas représentatifs de la situation. Il est conseillé de compter sur 5 x 5 plantes consécutives ; puis de calculer une moyenne ou un % par plante à rapprocher des seuils mentionnés dans le tableau. De plus il faut tenir compte des capacités de compensation des cultures.



Dégâts sur bouton

Rappel : les méligèthes sont présents dans l'ensemble des parcelles de colza quel que soit le secteur. Avec les températures très douces des semaines passées, les émergences d'adultes sont nombreuses et suscitent de nombreuses interrogations quant à leur lutte.

Les méligèthes se nourrissent de pollen : lorsque les fleurs sont encore au stade boutons, ils les perforent pour atteindre les étamines, ce qui peut endommager le pistil et conduire à leur avortement. Dès que les fleurs sont ouvertes, le pollen est libre d'accès et la nuisibilité devient généralement nulle et le traitement inutile.

La stratégie de lutte vis-à-vis des méligèthes a pour objectif de maintenir la population à un niveau acceptable (et non à l'éradiquer) pour que la floraison puisse s'engager sans retard important et que les compensations puissent s'exprimer au maximum. **Le colza dispose d'importantes capacités de compensation.** Lorsque la culture est vigoureuse, elle peut faire face à des attaques de méligèthes même fortes.

Objectif : Visiter toutes ses parcelles pour évaluer l'état des colzas et le niveau de présence du méligèthe

L'observation de l'état du colza est donc aussi primordiale que l'observation du ravageur

- Ne pas intervenir trop rapidement, mais essayer de faire « le plein » avant l'application d'un insecticide. Traiter 5 à 7 jours après que le seuil d'intervention a été atteint. Si une nouvelle intervention s'avère nécessaire, attendre une semaine.

Attention, certains traitements peuvent se révéler peu efficaces pour plusieurs raisons :

- « Dilution » de l'insecticide sur la végétation, due à la forte croissance des plantes (utiliser au moins 200 l/ha de bouillie),
- Recolonisation importante par arrivée massive de nouveaux individus

Les mligèthes sont résistants aux pyrèthrinoides classiques type lambda-cyhalothrine, deltaméthrine, cyperméthrine,... Le taufluvinate et l'étofenprox sont 2 pyrèthrinoides qui échappent à la rapide métabolisation par les mligèthes et conservent leur d'efficacité.

Les substances actives efficaces sur mligèthes

- L'étofenprox (TREBON 30 EC 0.2 l/ha)
- Le tau-fluvalinate (MAVRIK SMART ou KLARTAN SMART 0.2 l/ha)

Recommandations d'utilisation

- Volume de bouillie, un optimum autour de 200 l/ha, à défaut il est possible d'utiliser un mouillant type STICMAN 0,14 l/hl tout en étant moins efficace que 200 l d'eau.
- Protection des abeilles : Dangereux pour les abeilles (phrase SPE8) : pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et/ou en période de production d'exsudat, à l'exception des usages bénéficiant de la mention abeille F, PE, ou FPE. En cas d'intervention tardive (par exemple, stade E avec apparition des premières fleurs),

utiliser impérativement les solutions efficaces et bénéficiant d'une dérogation abeille : MAVRIK SMART, TREBON 30EC (stade limite d'utilisation BBCH61). Attention : ces applications font l'objet d'un arrêté encadrant les horaires d'application : dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil.

Avec les températures fraîches annoncées pour la semaine, les mligèthes devraient être plutôt léthargiques car leur activité est maximale lorsque les températures dépassent 15°C. En revanche le colza va continuer sa croissance ce qui incite plutôt à éviter les interventions insecticides cette semaine et à surveiller l'arrivée de températures plus favorables à leur activité et donc aux dégâts.

Nous aborderons la gestion du risque maladie dans le prochain flash.

BLÉ TENDRE D'HIVER

STADES DE LA SEMAINE

Tallage à 1 noeud



À SUIVRE CETTE SEMAINE

- > Risque maladies
- > Régulateur de croissance

Azote

Les deuxièmes apports vont débuter sur les secteurs tardifs et sont réalisés à hauteur de 30 à 90% en plaine. Il est possible d'observer les premières levées de liserons sur les parcelles sensibles. Les désherbages anti-graminées réalisés sur les 3 dernières semaines ont provoqué des marquages sur certains secteurs principalement liés aux amplitudes thermiques importantes et renforcées par les gelées matinales.

A noter que les premières taches physiologiques sur Thermidor sont signalées sur l'ensemble de la coopérative.

Régulateur de croissance : voir flash n°5

Gestion du risque maladies : au 10 mars 2026, le risque maladies sur blé tendre est plus élevé qu'en 2025.




Avec Abelio, anticipez les stades de vos cultures en 1 coup d'oeil, sachez exactement quand traiter et limiter votre utilisation de produits phytosanitaires : pour toute question, contactez votre technicien



Limaces encore très actives

Le risque climatique est plus élevé qu'en 2025 (où les semis tardifs avaient fortement limité le risque), mais nettement inférieur à celui de 2001 (référence haute). Cela s'explique par la douceur et l'humidité des mois de novembre et décembre, suivis d'un mois de février exceptionnellement doux avec de nombreuses contaminations.

Pour rappel, il n'existe pas de variétés résistantes au piétin-verse. On estime une variété tolérante à partir d'une note de 6/10. En cas de fortes attaques, il est possible d'avoir des pertes importantes sur ce type de variétés tolérantes (en 2024, notre essai fongicide piétin-verse laissait apparaître une perte de rendement de 10 qx/ha sur SY ADMIRATION noté 6)



Piétin-verse

Afin de pouvoir déterminer le risque potentiel d'apparition du piétin-verse dans vos parcelles, vous pouvez vous aider des éléments ci-dessous à savoir la grille nationale d'évaluation du risque piétin-verse, le tableau de sensibilité variétale et le risque climatique TOP (globalement le risque est de 30 à 45)

ORGE DE PRINTEMPS

À SUIVRE CETTE SEMAINE

> Gestion des limaces

Les semis sont terminés sur la majorité des secteurs. Quelques parcelles sont en cours de levée.

Les éléments clés pour réussir son orge de printemps :

- A partir du 15/03, il est préférable de ne plus semer d'orge de printemps : le potentiel de rendement se trouve affecté.
- Fertilisation azotée :
- Les expérimentations passées ont permis de définir la stratégie sécurisante pour l'orge de printemps à destination brassicole, à savoir : premier apport pour 1/3 de la dose prévue au semis puis le second apport au stade 3 feuilles de l'orge.
- Le soufre devra être apporté au stade 3 feuilles – tallage de l'orge : les besoins étant concentrés lors de la montaison.

Limaces :

Avec le retour des pluies ce week-end, il conviendra d'être très vigilant sur les orges de printemps qui lèvent. Pensez à mettre des pièges pour quantifier la pression limaces.

En cas de piégeage important, la lutte donnera la priorité au phosphate ferrique type IRON MAX, SLUX HP, ULTIMUS pour lesquels l'efficacité est égale au métaldéhyde type TECHN'O INTENS.



Levée en cours

FOCUS SUR : les analyses de terre

OFFRE JUSQU'AU 30/04/2026 : pack de 5 analyses + 2 gratuites

Dans les jours à venir, vos techniciens vous contacteront pour les prises de commande des analyses de terre. Petit tour d'horizon de l'intérêt des analyses mais aussi de la méthodologie de prélèvement.

Zone de prélèvement :

une parcelle, quelle que soit sa surface, est un milieu fortement hétérogène. Prélever l'échantillon toujours au même endroit, dans la parcelle, garantissant une bonne fiabilité dans le suivi des résultats analytiques.

A l'échelle de la parcelle : > Choisir une zone de 500m² environ, représentative du comportement général de la parcelle

> Eviter les endroits anormaux (anciens chemins, bordures, lieux de sotckage...)

> Repérer cette zone pour la prise des coordonnées GPS (géolocalisation du centre de la zone) qui serviront aux prélèvements et aux contrôles ultérieurs sur la parcelle.

> En cas d'étude d'anomalie de végétation, prélever 2 échantillons (dans la zone posant problème et dans la zone normale).

Dans la zone de prélèvement :

> Prélever à l'aide d'une tarière ou d'une bêche, sur la hauteur de l'horizon travaillé (0-30 cm pour les grandes cultures)

> Sur prairies, prélever sur la zone explorée par les racines (0-15 cm environ).

Mode opératoire

> Réaliser 15 sondages élémentaires le long d'un cercle d'une dizaine de mètres de rayon


> Mélanger ces prélèvements élémentaires dans un récipient propre, et prélever l'échantillon final de 500 g à 1 kg.

> L'échantillon sera placé dans les sachets mis à votre disposition par ICA

Période : tout au long de l'année

A noter : certains paramètres analytiques varient au cours du temps.

En fonction des conditions climatiques, les analyses d'une même parcelle devront être réalisées à la même période de l'année. Il est souhaitable d'attendre 1 mois après un apport d'engrais.





C'EST D'ACTUALITÉ : réussir sa prairie - 15/04/2026



RÉUSSIR SA PRAIRIE

MERCREDI 15/04/2026



SALON DE L'HERBE
Gaec des Moidons - Chilly/Salins (39)

**Un rendez-vous grandeur nature :
4 ha de démonstrations, de matériels et de conseils
pour valoriser vos prairies**

4 THÈMES

Mise en place prairie
Valeur nutritive de l'herbe
Fertilisation
Collections variétales

11 ATELIERS

Travail du sol, désherbage,
chaulage, gestion du pâturage,
engrais, profil de sol...

1 CONFÉRENCE NUTRITION ANIMALE

animée par le Docteur Vétérinaire
Christophe SUDRAUD



Inscription sur interval.coop



Inscription sur interval.coop



Accueil café à partir de 9h



Visite libre des ateliers de 9h30 à 17h



Exposition de matériel



2 conférences nutrition animale : 11h-12h30 et 15h-16h30



Repas lors de la pause de midi



**Pour ceux qui souhaitent une visite de l'ensemble des ateliers,
des départs de groupe sont prévus entre 9h30 et 10h**



RÉUSSIR SA PRAIRIE

MERCREDI 15/04/2026



SALON DE L'HERBE
Gaec des Moidons - Chilly/Salins (39)



AGENDA

Tours de plaine collectifs

Date	Horaire	Lieu	Thématique / Intervenant
25/03/2026	9 h	CHAUSSIN	Insecticide du sol - TRIKA TOUR
25/03/2026	14 h	PETIT NOIR	Insecticide du sol - TRIKA TOUR
27/03/2026	9 h	ST AUBIN	Respect des pollinisateurs - ADAMA
27/03/2026	14 h	CHAMBLAY	Respect des pollinisateurs - ADAMA
14/04/2026	14 h	BLETTERANS	Gestion des limaces par DE SANGOSSE
14/04/2026	9 h	ST GERMAIN	Gestion des limaces par DE SANGOSSE
15/04/2026	9 h	CHILLY SUR SALINS	Journée : réussir sa prairie
16/04/2026	9 h	ARCHELANGE	Respect des pollinisateurs by ADAMA
16/04/2026	14 h	ORBAGNA	Respect des pollinisateurs by ADAMA
17/04/2026	9 h 30	VALAY	TRIKA TOUR : insecticide du sol
21/04/2026	14 h	CHAUSSIN	Agronutrition : nutriscope SENSEEN
21/04/2026	9 h	PETIT NOIR	Agronutrition : nutriscope SENSEEN
22/04/2026	9 h	ROCHE	TRIKA TOUR : insecticide du sol
22/04/2026	14 h	AUTREY	TRIKA TOUR : insecticide du sol

PHOTOS D'ACTUALITÉ



Carence en soufre



Parcelle sableuse avec problème d'acidité



Ecart de précocité variétale



Plantation des bulbillles d'oignon



Rond de JNO sur orge (secteur TALMAY)

SMAG FARMER : votre outil du quotidien 100% web et mobile



Du semis à la récolte, **SMAG FARMER** simplifie le pilotage agronomique, réglementaire et économique de votre exploitation agricole :



- 1 **J'ORGANISE** mon assolement et mes interventions
- 2 **JE PILOTE** mes techniques culturales
- 3 **J'ANALYSE** ma performance économique
- 4 **JE SUIS EN PHASE** avec la réglementation

Pourquoi s'abonner avec le Groupe Interval ?



Accompagnement dédié avec notre expert Sébastien BALDUINI (07 62 40 68 00)



Synergie SMAG Farmer/SMAG Expert (logiciel Coop) avec la remontée des assolements, des Prévisionnels Fertilisation et prévisionnels de ventes phytosanitaires et l'appui de votre technicien référent



Gestion plus efficace des différents dossiers intégrant votre cartographie (reliquats azotés, analyses de sol, chanvre, Abelio, Multiplication, Waxy, Soja non déforestant, trichogrammes par drone)

Sébastien BALDUINI, notre expert INTERVAL est disponible pour toute démonstration de l'application et vous accompagne pour la mise en route de l'abonnement

En vous abonnant au logiciel SMAG Farmer avec INTERVAL vous serez en conformité avec l'obligation réglementaire UE 2023/564 qui impose le registre de traçabilité numérique à compter du 1^{er} janvier 2027

Avertissement : Ce bulletin technique est un outil d'aide à la réflexion. Les données qui y figurent proviennent de sources multiples (synthèse d'observations internes et du BSV, évolutions réglementaires, informations d'instituts et de fournisseurs, expérimentations internes et externes...). Les informations générales concernant la situation sanitaire des cultures ne peuvent en aucun cas se substituer aux observations et décisions parcellaires (vos observations dans vos parcelles). Il n'y a aucune préconisation dans ce bulletin.
Pour prendre ses décisions, il appartient à chaque agriculteur de vérifier l'état sanitaire sur ses propres parcelles. Vous êtes le seul décideur et le seul responsable de la conduite de vos itinéraires culturaux. La protection intégrée est obligatoire depuis 1994. L'agriculteur doit tout mettre en œuvre pour réduire l'emploi des pesticides. Il doit prioriser toutes les solutions préventives ou alternatives (choix variétal, méthodes agronomiques...). Lorsque la culture est en place, en cas d'intervention, vous devez prioriser les solutions alternatives ou les solutions de biocontrôle lorsqu'elles existent. L'observation est essentielle pour affiner les décisions et justifier vos choix et les interventions sur chaque parcelle. Les solutions chimiques doivent être utilisées en dernier recours. Lorsque l'agriculteur choisit un produit phytosanitaire, le vendeur peut alors lui fournir les informations appropriées concernant l'utilisation des PPP, notamment la cible, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation (dont la gestion des déchets) et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques. Vous devez lire attentivement la notice technique (ou l'étiquette) qui figure sur les bidons avant emploi. N'oubliez pas de tracer et justifier toutes vos interventions.