



Infocoop

Grandes Cultures

Agrément n° FC00055 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels



#06

13/10/2026



SITUATION DE LA SEMAINE

Enfin le retour des pluies !!! les cumuls sont assez hétérogènes allant de 15 à 45 mm.

A noter le retour d'un temps automnal avec un fort rafraichissement des températures. Cette météo va permettre la mise en germination d'adventices et de repousses dans les parcelles destinées aux céréales à paille.

Les récoltes d'automne sont particulièrement avancées, l'essentiel des tournesols et sojas étant récolté et il reste 5 à 10 % des maïs.



Nombreux travaux dans les champs



COLZA

STADES DE LA SEMAINE

Cotylédons à 10 feuilles



Avec les pluies, la croissance est très dynamique et se poursuivra ainsi tant que les températures le permettront (le 0 de végétation étant à 0°C).

Piégeage en cuvette du 2 au 9/10/26

Commune	Grosses altises adultes	CBT
Tavaux	14	0
Longwy/le doubs	23	0
Abergement	8	1
St Aubin	5	0
Lavangeot	30	0
La Barre	33	0
La loye	37	0
Authume	42	0
Chevigny	49	0
Malans	40	0
Cosges	5	0
Saint Usage	11	0
Badevel	6	0
Chissey/Loue	10	0
Bans	3	0

Commune	Grosses altises adultes	CBT
Dompierre/Mont	3	0
La tour du Meix	2	0
Amancey	3	0
Nozeroy	2	0
Mont le vernois	8	0
Perrenot	8	0
Ovanches	6	0
Framont	19	0
Frettes	15	0
Fahy les autrey	11	0
Champlitte	16	0
Tanay	13	0
Rioz	2	0
Traitefontaine	4	0
Tresilley	11	0

Commune	Grosses altises adultes	CBT
Les Aynans	3	0
Courbenans	8	0
Senargent	5	0
Etritefontaine	8	0
Colombotte	8	0
Loulans	10	0
Roche	11	0
Vauconcourt	9	0
Avrigny	14	0
Noironte	9	0
Chevigny	4	0
Maxilly/Saone	3	0
Dorans	2	0

Les petits colzas n'ayant pas encore atteint le stade 4-5 feuilles sont les plus sensibles aux attaques de petites et grosses altises, certaines parcelles doivent être surveillées.

Seuil de nuisibilité : petites altises et grosses altises : 80% de plantes avec morsures et 25 % de surface foliaire détruite*

* Plus qu'un seuil basé sur le pourcentage de plantes avec morsures et le pourcentage de surface foliaire détruite, ce sont la vitesse d'accumulation des dégâts et la vitesse de croissance de la culture qui, pris en compte quasiment quotidiennement, permettent de bien appréhender ce risque altises adultes.

Gestion des graminées : les graminées adventices type vulpins ray-grass sont déjà nombreuses dans certaines parcelles. La pro-pyramide ne suffira pas pour les détruire totalement, c'est pourquoi l'utilisation de produits comme SELECT ou BEMYE est nécessaire. Les conditions climatiques actuelles sont propices à ce type d'application (températures mini 5°C et hygrométrie > 60).

BIFAST 1 l/ha + SELECT / BEMYE 0,5 l/ha + huile 1l/ha



STADES DE LA SEMAINE
Semis à 2 feuilles



Gamme variétale et date de semis

Variété	1er semis		Montaison	Epiaison	Alternati.
KWS SPHERE	25/09	19%	2	6,5	2
RGT MAJESKO	25/09		2	6+	3
FEDERIS (BAF)	25/09		3	6	2
LG ABSALON	1/10	28%	3	6,5	3
KAROQUE	1/10		3	7	3
JUNIOR	1/10		3	6	2
CONQUISTADOR	5/10	24%	3	7	3
INTENSITY	5/10		3	6,5	3
SU HYREAL	5/10		3	6,5	2
KWS CONSTELLUM (BAF)	5/10		3	7	2
SPIROU	10/10	5%	3	6,5	4
SY ADMIRATION	15/10	13%	4	6,5	4
BATMAN	15/10		4	6,5	2
LID FORLANE (BAF)	15/10		4	7	3
THERMIDOR	20/10	11%	4	7	4
LG ASTERION	20/10		4	7,5	4
BEAUREGARD (ALT.)	> 25/10	1%	4	6,5	8

La majorité des variétés sont dans la période optimale de semis.

Pour LG ASTERION, THERMIDOR et BEAUREGARD il est encore trop tôt pour envisager les semis. Ce sont des variétés précoces à montaison pour lesquelles le risque de gel d'épi (comme en 2012) est important.

Consignes pour éviter les phyto-toxicité liées aux herbicides racinaires :

1. Soigner les préparations de sols afin de positionner les semences à une profondeur régulière > aucune graine ne doit être visible en surface
2. En cas d'application d'herbicide à action racinaire prévue à l'automne : semis à 3 cm mini (si aucun herbicide prévu à l'automne : semis entre 1 et 2,5 cm)
3. Eviter l'application d'herbicide si plus de 25 mm de pluie sont annoncés dans les 5 jours.
4. Respecter un délai de 15 jours mini entre 2 applications herbicide (cas des parcelles prévues en post-semis puis en post-levée)

Consignes de bonne gestion du prosulfocarbe :

RESPECTER UNE ZONE NON-TRAITEE
(personnes présentes et zones d'habitation et d'activité)

- 10m avec un dispositif homologué réduction de dérive à 90%.
- ou à défaut, 20m avec tout autre dispositif homologué réduction de dérive.

UTILISER DES BUSES ANTI-DERIVE

Dans toutes les situations, utiliser obligatoirement des buses à injection d'air homologuées « réduction des zones non traitées (ZNT) », de préférence à 90%.

RESPECTER LA DOSE

- 2400g max /ha/an pour les formulations prosulfocarbe seul.
- 1280g max /ha/an pour les formulations prêtes à l'emploi de prosulfocarbe et clodinafop-propargyl.

RESPECTER LA PERIODE D'APPLICATION

Jusqu'à 3 feuilles de la culture.

PRENDRE EN COMPTE LES CULTURES NON-CIBLES*

Ne pas appliquer de prosulfocarbe dans un rayon de 1km autour des cultures non-cibles avant leur récolte.

Désherbage : voir flash n°5

Insectes : sur les parcelles (ou zones de parcelles) déjà levées, la pression insecte est importante tant pour les cicadelles grises que pour les pucerons.

Seuil de nuisibilité pucerons : 10 % des plantes portent au moins un puceron ou présence avérée depuis plusieurs jours.

Seuil de nuisibilité cicadelles grises : il est fixé à partir de 30 captures hebdomadaires sur un pièce englué jaune.

La plupart des blés et des orges sont concernée par cette problématique insectes sauf les variétés tolérantes à la JNO (Constel, Manade, LG Zorica et SY SPAROO).

Solutions à la gamme :

Liste des produits et associations	Matières actives et concentrations	Liste IFBM N°28	Nombre d'application par campagne	ZNT classique	ZNT riverains	ZNT autre	DRE	Principaux ravageurs d'automne		
								Pucerons du feuillage	Cicadelle	Zabre
Pearl expert	Deltaméthrine 100 g/l	Oui	2/an fractionnable	20 m	5 m	5 m arthropodes non cibles	24 h	0,075 l	0,075 l	0,075 l
Envergure	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	Oui	3/an non fractionnable	20m à 0,0625l/ha, 50m à 0,075l/ha	5 m	-	48 h	0,075 l	0,075 l	NH
Mavrik Smart	Tau-fluvalinate 240 g/l	Oui	1 à 2/an selon cible non fractionnable	20 m	5 m	-	6 h	0,2 l	0,2 l	NH
Laidir	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	Non	3/an non fractionnable	20m à 0,0625l/ha, 50m à 0,075l/ha	5 m	-	48 h	0,075 l	0,075 l	NH
Dose		Bonne efficacité			Dose		Efficacité moyenne		NH	Non homologué



FOCUS :

Cas de contamination de silos d'ensilage de maïs par des aflatoxines

Des cas de contamination de silos d'ensilage de maïs par des aflatoxines (notamment l'aflatoxine B1) ont été détectés dans notre région, favorisés par les vagues de chaleur et le stress hydrique estival.

Historiquement, les aflatoxines étaient quasi inexistantes en France. Mais depuis une dizaine d'années, en lien avec le changement climatique, leur présence dans l'Hexagone est avérée. Or, certaines d'entre elles, notamment l'aflatoxine B1, présentent un risque élevé pour la santé. Ingérée en grande quantité, cette mycotoxine endommage le foie de façon irréversible. Une exposition réduite mais plus régulière a un effet carcinogène, tératogène et altère durablement le système immunitaire.

Ce qu'il faut savoir sur l'aflatoxine dans l'ensilage de maïs :

- **Origine :** Elle est produite par des champignons du genre *Aspergillus* (*Aspergillus flavus* ou *Aspergillus parasiticus*) qui se développent particulièrement lors d'épisodes de fortes chaleurs et de sécheresse pendant la culture ou en cas de mauvaise conservation.
- **Risque pour les animaux :** L'ingestion d'aliments contaminés peut provoquer de graves lésions hépatiques chez les animaux d'élevage.
- **Risque pour la filière (lait) :** L'aflatoxine B1 ingérée par les vaches laitières se transforme partiellement en aflatoxine M1 et se retrouve dans le lait, soumettant la production à des seuils réglementaires stricts de la Commission européenne.
- **Surveillance :** Bien que les bilans globaux (comme ceux de l'Observatoire des mycotoxines) puissent montrer un risque modéré à l'échelle nationale, des foyers localisés et sévères peuvent apparaître après des étés très secs.

Bonnes pratiques et prévention :

- **Analyses en laboratoire :** En cas de doute ou de contexte climatique à risque (sécheresse), il est recommandé de faire réaliser des analyses ciblées sur les stocks d'ensilage.
- **Maîtrise de l'ensilage :** Assurer une bonne compaction, une étanchéité rigoureuse du silo et une distribution rapide pour limiter la prolifération fongique.

Au champ, **il n'existe pas de traitements fongicides** pour contrôler les populations de champignons responsables des contaminations aux aflatoxines. En revanche, parmi les pratiques limitant leur présence, l'irrigation se démarque. D'une part car les plantes non stressées sont moins sensibles aux contaminations, et d'autre part car le champignon est moins compétitif en milieu non contraint en eau.

Pour la sécurité alimentaire des animaux, des capteurs de mycotoxines sont commercialisés.

Ces capteurs de mycotoxines sont composés de **produits naturels comme les aluminosilicates et argiles ainsi que des levures et produits de fermentation**, des composants aux propriétés complémentaires. On retrouve des substances adsorbantes qui captent les mycotoxines et neutralisent leur toxicité. Leur efficacité varie selon la structure et la polarité de la mycotoxine, ce mode d'action est le plus courant dans la lutte contre les mycotoxines. En complément du captage des mycotoxines, des enzymes produites à partir de micro-organismes permettent une bio transformation afin de désactiver les mycotoxines au niveau du tube digestif.

Cette méthode est notamment efficace sur les mycotoxines présentes à forte concentration. Chez les ruminants, la flore du rumen a une capacité de désactivation naturelle qui peut être boostée par l'ajout de levures vivantes.





C'EST D'ACTUALITÉ : Renouvellement du réseau DEPHY FERME

L'appel à projets pour le renouvellement du réseau DEPHY FERME pour la période 2027-2031 devrait être lancé à compter de la mi-octobre 2026.

Vous pouvez d'ores et déjà consulter les premières informations relatives à cet appel à projets sur la page EcophytoPIC dédiée en cliquant ici > Suivre le lien

Afin d'accompagner les futurs candidats dans la préparation de leur candidature, un webinaire de présentation est organisé le 15 octobre 2026, de 14h à 15h30, sous réserve de validation de l'appel à projets. Il permettra de présenter le dossier de candidature, les modalités de réponse à l'appel à projets, ainsi que les principales attentes associées. Un temps d'échange sera également consacré aux questions des participants.

Pour toute question, vous pouvez contacter la cellule d'animation nationale DEPHY à l'adresse suivante : cellule.dephy@france.chambres-agriculture.fr

Obtenir plus dans l'application Événements
Découvrez les événements à venir, explorez de nouveaux événements et planifiez les vôtres : tout est dans l'application Événements.

Ouvrir dans Événements

Webinaire de présentation de l'AAP renouvellement DEPHY FERME 2027-2031

Ajouter au calendrier

S'inscrire

● jeudi 15 octobre, 2:00 PM - 3:30 PM

● En ligne

● Tout le monde peut voir et rejoindre.

jeudi, 15 octobre, 2:00 PM À venir

Webinaire de présentation de l'AAP renouvellement DEPHY FERME 2027-2031

Dans le cadre du renouvellement du réseau DEPHY FERME pour la période 2027-2031, ce webinaire a pour objectif de présenter le dossier de candidature ainsi que les modalités de réponse à l'appel à projet. Un temps d'échange sera également prévu afin de répondre aux questions des futurs candidats.

Inscrivez-vous au webinaire en cliquant sur l'image



AGENDA : tours de plaine collectifs

Date	Horaire	Lieu	Thématique / Intervenant
22/10/2026	8h30	Saint Aubin	Mosaïques des céréales
27/10/2026	9h	Bletterans	Corteva : gestion des chardons + propyzamide
27/10/2026	14h30	Saint Germain du bois	Corteva : gestion des chardons + propyzamide
29/10/2026	9h	Petit-Noir	BASF : formulation phyto
29/10/2026	14h	Chaussin	BASF : formulation phyto
03/11/2026	9h	Orbagna	De Sangosse limaces
03/11/2026	14h	Mont sous Vaudrey	Visite essai La Loye
04/11/2026	9h	Colonne	SENCROP




PHOTOS D'ACTUALITÉ



Les repousses ont étouffé le colza.



Radis fourrager



Hernie des crucifères



Blé au stade 3 feuilles



Levée en cours



Egrenage important avant récolte